

LISTA 1: LISTA DE VERIFICACIÓN - EVALUACIÓN ANTES DE PRESCRIBIR METILFENIDATO

Este documento ha sido diseñado para proporcionarle información que pueda servirle de soporte para determinar si la prescripción de metilfenidato (MTF) en su paciente es apropiada. Consulte toda la información del fármaco que pretende recetar para la indicación y grupo de edad aprobados.

Es muy importante identificar de manera correcta a los pacientes que sean candidatos al tratamiento con MTF, ya que se deberá excluir a aquellos pacientes que presenten ciertas patologías concomitantes, y se deberá identificar a aquellos que precisan una especial atención, entre ellas las enfermedades o síntomas cardiovasculares, cerebrovasculares y neuropsiquiátricos.

Se recomienda usar esta lista de verificación junto con la ficha técnica del medicamento prescrito.

Por favor, descargue e imprima esta lista antes de la consulta, ya que no podrá almacenar información específica del paciente en el sitio web. Por lo que se recomienda que incluya esta lista de verificación completada en la historia del paciente, junto con el resto de documentos complementarios.

Asimismo, le recomendamos que, a medida que vaya evaluando lo descrito en esta lista, revise el prospecto del medicamento prescrito con el paciente y, en caso de que sea un niño o adolescente menor de 18 años, también junto con su madre/padre/tutor(es) legal(es).

Antes de iniciar el tratamiento con MTF

Fecha de la evaluación:	
Motivo de la evaluación:	
Fecha de nacimiento:	
Sexo:	

Contraindicaciones - A los pacientes con alguno de los siguientes problemas, comorbilidades y/o medicaciones concomitantes no se les deben administrar MTF:

	Evaluado
• Hipersensibilidad conocida al metilfenidato o a alguno de los excipientes	<input type="checkbox"/>
• Glaucoma	<input type="checkbox"/>
• Feocromocitoma	<input type="checkbox"/>
• Tratamiento con inhibidores irreversibles no selectivos de la monoaminoxidasa (MAO) y como mínimo en los 14 días posteriores a la suspensión del tratamiento con estos fármacos, por el riesgo de una crisis hipertensiva	<input type="checkbox"/>
• Hipertiroidismo o tirotoxicosis	<input type="checkbox"/>
• Diagnóstico o antecedentes de comorbilidades psiquiátricas: - depresión grave - anorexia nerviosa/trastornos de anorexia - tendencias suicidas - síntomas psicóticos - trastornos del humor graves - manía - esquizofrenia - trastorno de la personalidad psicopático/limite - trastorno bipolar (afectivo) grave y episódico (Tipo I) (que no está bien controlado)	<input type="checkbox"/>
• Comorbilidades cardiovasculares pre-existentes incluyendo: - hipertensión grave - insuficiencia cardíaca - enfermedad arterial oclusiva - angina - enfermedad cardíaca congénita hemodinámicamente significativa - cardiomiopatías - infarto de miocardio - arritmias potencialmente mortales - canalopatías (trastornos provocados por la disfunción de los canales iónicos)	<input type="checkbox"/>
• Comorbilidades cerebrovasculares pre-existentes - aneurisma cerebral, - anomalías vasculares incluyendo vasculitis o apoplejía - comorbilidades cerebrovasculares pre-existentes	<input type="checkbox"/>

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Noviembre 2021

Advertencias y precauciones especiales de empleo

Tras la evaluación efectuada conforme a los criterios anteriores, por favor, complete el siguiente cuadro para dejar registrado la información de referencia que le ayude a determinar cuál es el seguimiento continuado adecuado.

Antecedentes familiares	
	Evaluado
• Antecedentes familiares de muerte súbita cardíaca o inexplicada	<input type="checkbox"/>
• Antecedentes familiares de arritmia maligna	<input type="checkbox"/>
• Antecedentes familiares del síndrome de Tourette	<input type="checkbox"/>

EVALUACIÓN BASAL DEL PACIENTE

Historia clínica y examen físico del paciente	
<i>Se debe extremar la precaución a la hora de prescribir MTF a pacientes con ciertas comorbilidades o tratamientos concomitantes y valorar cuidadosamente la relación beneficio/riesgo y la conveniencia de usar MTF (ver sección 4.4 de la ficha técnica correspondiente)</i>	
	Evaluado
Trastornos cardiovasculares	
• Antecedentes de enfermedad cardiovascular	<input type="checkbox"/>
• Anomalías cardíacas estructurales conocidas, cardiomiopatía, anomalías graves del ritmo cardíaco, aumento de la vulnerabilidad a los efectos simpaticomiméticos de un medicamento estimulante	<input type="checkbox"/>
• Enfermedad cardiovascular	<input type="checkbox"/>
• Estado médico subyacente que se pueda ver afectado por el aumento de la presión arterial o de la frecuencia cardíaca	<input type="checkbox"/>
Trastornos psiquiátricos/neurológicos	
• Trastornos psiquiátricos preexistentes	<input type="checkbox"/>
• Síntomas psicóticos o maniacos preexistentes	<input type="checkbox"/>
• Comportamiento agresivo u hostil	<input type="checkbox"/>
• Tics motores o verbales, o síndrome de Tourette	<input type="checkbox"/>
• Ansiedad, agitación o tensión	<input type="checkbox"/>
• Síntomas depresivos (evaluar el riesgo de padecer un trastorno bipolar; esta evaluación debe incluir una historia psiquiátrica detallada, incluyendo antecedentes familiares de suicidio, trastorno bipolar y depresión)	<input type="checkbox"/>
• Trastorno bipolar	<input type="checkbox"/>
• Epilepsia. Pacientes epilépticos con antecedentes de convulsiones; pacientes con alteraciones del EEG previas en ausencia de convulsiones	<input type="checkbox"/>
• Antecedentes de dependencia a drogas o de mal uso de los estimulantes del sistema nervioso central	<input type="checkbox"/>
Otras condiciones médicas, como:	
• Intolerancia conocida a excipientes	<input type="checkbox"/>
• Insuficiencia renal o hepática conocida	<input type="checkbox"/>
• Presencia de leucopenia, trombocitopenia, anemia u otras alteraciones, incluyendo aquellas que indiquen trastornos renales o hepáticos graves	<input type="checkbox"/>
Embarazo: no se recomienda la utilización de MTF a menos que se haya tomado una decisión clínica que suponga que retrasar el tratamiento puede conllevar un riesgo mayor para el embarazo	<input type="checkbox"/>
Lactancia: se debe decidir, teniendo en cuenta el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la mujer, si interrumpir la lactancia o interrumpir/abstenerse del tratamiento con MTF	<input type="checkbox"/>
Posibles interacciones con otros medicamentos u otras sustancias	
<i>Farmacocinética</i>	
• Anticoagulantes cumarínicos	<input type="checkbox"/>
• Anticonvulsivantes (como el fenobarbital, la fenitoína o la primidona)	<input type="checkbox"/>
• Antidepresivos (tricíclicos e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina)	<input type="checkbox"/>
<i>Farmacodinámica</i>	
• Fármacos antihipertensivos	<input type="checkbox"/>
• Fármacos que aumentan la presión sanguínea	<input type="checkbox"/>
• Alcohol	<input type="checkbox"/>
• Anestésicos halogenados	<input type="checkbox"/>
• Agonistas alfa2 de acción central (por ejemplo, clonidina)	<input type="checkbox"/>
• Antagonistas dopaminérgicos, incluyendo antipsicóticos	<input type="checkbox"/>
• L-dopa u otros agonistas dopaminérgicos	<input type="checkbox"/>

Anote aquí la información adicional que considere pertinente

Tras la evaluación conforme a los criterios anteriores, por favor, complete el cuadro facilitado para registrar información de referencia que le ayude a determinar cuál es el seguimiento continuado adecuado: **(Ver Cuadro para el seguimiento durante el tratamiento con Metilfenidato (MTF))**

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente o del formulario electrónico disponible en <https://www.notificaRAM.es>