

## Metyylifenidaattihoidon aikana käytettävä seuranta-kaavio

Kuten valmisteyhteenvedossa on ohjeistettu, potilaan kasvua sekä psykiatrista ja kardiovaskulaarista tilaa on seurattava säännöllisesti:

- Verenpaine ja syke on kirjattava jokaisen annosmuutoksen yhteydessä ja sen jälkeen vähintään kuuden kuukauden välein.
- Pituus, paino ja ruokahalu on kirjattava vähintään kuuden kuukauden välein ja kasvukäyriä on seurattava - koskee vain lapsia ja alle 18-vuotiaita nuoria.
- Uusien oireiden kehittymistä tai jo olemassa olevien psykiatristen häiriöiden pahenemista on seurattava jokaisella käynnillä, jokaisen annosmuutoksen yhteydessä ja sen jälkeen vähintään kuuden kuukauden välein.

Ensimmäisen arvioinnin päivämäärä:

Potilaan nimi:

Syntymäaika:

Ikä:

Sukupuoli:

	Lähtötaso	Seuraavat käynnit											
Arviointi-päivämäärä													
Arvioinnin syy													
Veren-paine*													
Syke*													
Paino (kg)**													
Pituus (cm)**													
Ruokahalu**													

\*Verenpaine ja syke on kirjattava jokaisen annosmuutoksen yhteydessä ja sen jälkeen vähintään kuuden kuukauden välein.

\*\*Pituus, paino ja ruokahalu on kirjattava vähintään 6 kuukauden välein ja kasvukäyriä on seurattava. Tämä koskee vain lapsia ja alle 18-vuotiaita nuoria.