Tarkistuslista 2: Tarkistuslista metyylifenidaattihoidon seurantaa varten

Seuraava on tarkoitettu auttamaan metyylifenidaattia sisältävillä lääkevalmisteilla annettavan hoidon seurannassa potilailla, joilla on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD).

Kuten valmisteyhteenvedossa on ohjeistettu, potilaan kasvua (koskee vain lapsia ja alle 18-vuotiaita nuoria) sekä psykiatrista ja kardiovaskulaarista tilaa on seurattava säännöllisesti:

- Verenpaine ja syke on kirjattava jokaisen annosmuutoksen yhteydessä ja sen jälkeen vähintään kuuden kuukauden välein.
- Pituus, paino ja ruokahalu on kirjattava vähintään kuuden kuukauden välein ja kasvukäyriä on seurattava (koskee vain lapsia ja alle 18-vuotiaita nuoria).
- Uusien oireiden kehittymistä tai jo olemassa olevien psykiatristen häiriöiden pahenemista on seurattava jokaisella käynnillä, jokaisen annosmuutoksen yhteydessä ja sen jälkeen vähintään kuuden kuukauden välein.

Suosittelemme tämän tarkistuslistan käyttöä yhdessä määrättävän lääkevalmisteen valmisteyhteenvedon kanssa.

Lataa ja tulosta tämä tarkistuslista ennen potilaan käyntiä. Verkkosivuilla ei ole mahdollista säilyttää mitään potilastietoja. Täytetty tarkistuslista voidaan liittää sairauskertomukseen.

Käydessäsi läpi tarkistuslistaa on hyvä keskustella määrättävästä lääkevalmisteesta potilaan tai tämän huoltajien ja lasten tai alle 18-vuotiaiden nuorten kohdalla heidän vanhempien tai huoltajien kanssa pakkausselostetta hyödyntäen.

Seuranta jatkuvan metyylifenidaattihoidon aikana

Arviointipäivämäärä: _____

Arvioinnin syy: _____

Potilaan nimi: _____

Syntymäaika: _____

Ikä: _____ Sukupuoli: _____

Tarkista huolellisesti seuraavat oireet ja löydökset <u>jokaisen annosmuutoksen yhteydessä sekä seurantakäynneillä vähintään kuuden kuukauden välein:</u>

	Arvioitu
Yleiset terveyteen liittyvät havainnot, lapset ja alle 18-vuotiaat nuoret	
- Kirjaa ylös pituus, paino ja ruokahalu (katso erillistä seurantakaaviota) - Koskee vain lapsia ja alle 18-vuotiaita nuoria	☐
Harkitse metyylifenidaattihoidon lopettamista, jos potilaan kasvu on alle odotusten	
Yleiset terveyteen liittyvät havainnot, kaikki potilaat	
• Kirjaa ylös mahdollinen metyylifenidaatin väärinkäyttö, virheellinen käyttö tai poikkeamat annetuista ohjeista	☐
• Raskaus	☐
Arvioi hyöty-haittasuhde	
Uudet kardiovaskulaariset löydökset, kaikki potilaat — **Verenpaine ja syke tulee kirjata ylös**	
• Sydämentykytys	☐
• Rasitusrintakipu	☐
• Selittämätön pyörtyily	☐
• Hengenahdistus	☐
• Muut sydänsairauteen viittaavat oireet	☐
Lähetä potilas tarvittaessa kardiologin arvioitavaksi	
Uudet neurologiset löydökset, kaikki potilaat	
• Vaikea päänsärky, tunnottomuus, heikkous tai paralyysi, koordinaatio-, näkö-, puhe-, kieli- tai muistihäiriöt	☐
Kaikki edellä olevat tilat saattavat viitata aivojen vaskuliittiin: lopeta metyylifenidaattihoito	
• Kohtaustiheyden lisääntyminen tai uusien kohtausten alkaminen	☐
Metyylifenidaattihoito on lopetettava	

	Arvioitu
Uudet psykiatriset löydökset tai entisten paheneminen, kaikki potilaat	**Uusien oireiden kehittyminen tai entisten psykiatristen häiriöiden paheneminen**
• Psykoottiset tai maaniset oireet	☐
Harkitse metyylifenidaattihoidon lopettamista.	
• Itsemurha-ajatukset tai siihen liittyvä käyttäytyminen	☐
Harkitse psykiatrisen perustaudin hoitamista	
Arvioi hyöty-haittasuhde uudelleen	
Harkitse metyylifenidaattihoidon lopettamista.	
• Aggressiivinen ja vihamielinen käyttäytyminen	☐
Harkitse, pitääkö hoitoa muuttaa	
• Ahdistuneisuus, kiihtyneisyys tai jännittyneisyys	☐
• Masennusoireet	☐
• Motoriset tai äänelliset nykimisoireet tai niiden paheneminen	☐
Hoidon kesto, kaikki potilaat	
• Potilaan hoito on jatkunut yli12 kuukautta.	☐
• Oireiden paraneminen asianmukaisen annosmuutoksen jälkeen yhden kuukauden havaintojaksolla, muussa tapauksessa suositellaan lääkevalmisteen käytön lopettamista	☐
Harkitse lääkkeetöntä jaksoa vähintään kerran vuodessa, jotta voit määrittää, onko hoito vielä tarpeen	

Kirjaa mahdolliset lisätiedot tähän

Edellä mainitun arvioinnin jälkeen kirjaa kaavioon tarvittavat tiedot jatkuvaa seurantaa varten: **(linkki kaavioon)**

Hoidon päättyminen

Lääkevalmisteen lopetusjakson aikana on varmistettava huolellinen seuranta, koska tällöin voi paljastua seuraavia:

- **masennus** sekä
- **krooninen ylivilkkaus**

Pitkäaikainen seuranta saattaa olla tarpeen joillekin potilaille.